

Протипоказання

- Вагітність або підозра на вагітність пацієнтки
- Якщо пацієнт має історію анафілактичних реакцій
- Якщо пацієнту поставлений діагноз цукровий діабет
 - Якщо поруч з грижею міжхребцевого диска виявлена пухлина
- При втраті сил в будь-якій групі м'язів на 3/5 або більше або при неврологічному дефіциті
- Якщо пацієнт страждає на астму (Різкий запах виробу може викликати напад астми)
- Якщо пацієнт протягом 1 тижня після застосування планує далеку поїздку (2 години або більше) або переліт на літаку
- Протягом перших 24-годин після застосування виробу пацієнт повинен лежати на спині з дотриманням постільного режиму (крім короткострокових потреб - харчування або туалет), в іншому випадку виріб прийде в стан непридатності і не буде виконувати своїх функцій.
- Наявність пошкоджень шкіри на місці застосування (щоб виключити ризик зараження)

Побічні ефекти

- У пацієнтів з atopічною або чутливою шкірою можуть виникнути кірки, еритема, почервоніння, запалення, подразнення і свербіж в місці застосування. Але ця ситуація носить тимчасовий характер і не вимагає будь-якого лікування. По бажанню пацієнта, після закінчення застосування можна використовувати живильні і / або тонізуючі креми, що заспокоюють шкіру. В результаті спостережень, частота побічних ефектів визначена наступним чином:
 - Широко поширені побічні ефекти (спостерігаються як мінімум у 1 з 10 пацієнтів) - легкий свербіж на місці застосування і легке почервоніння
 - Поширені побічні ефекти- (Спостерігаються менш, ніж у 10 з 100 пацієнтів і більш, ніж у 1 з 100 пацієнтів)- легке подразнення шкіри (роздратування і почервоніння шкіри)
 - Нерозповсюджені побічні ефекти (спостерігаються менш, ніж у 1 з 100 пацієнтів, але більш, ніж у 1 з 1000 пацієнтів) – сильне роздратування шкіри (сильне роздратування, порушення цілісності шкіри, покриття кіркою, еритема)

Крім того, для всіх користувачів може бути присутнім ризик анафілаксії, яка оцінюється в класі «Серйозні Несприятливі Ситуації ». Не рекомендується використовувати виріб пацієнтам з чутливістю до будь-якого з компонентів і пацієнтам, які раніше перенесли афілаксію.